

### اقدامات حین آندوسکوپی:

- ✓ شما می توانید تا زمانی که کودکتان داروی آرام بخش می گیرد بالای سر کودکتان بمانید و هنگام شروع آندوسکوپی اتاق را ترک نمایید.
- ✓ به کودکتان یک داروی آرام بخش و ضد درد داده می شودتا در طی آندوسکوپی آرام باشد.
- ✓ لوله آندوسکوپی یک لوله نرم و بلند است که در سر آن دوربین کوچکی نصب شده است تا پزشک بتواند مسیر دستگاه گوارش را ببیند.
- ✓ پزشک به آرامی این لوله را در دهان کودک می کند و تصویر روی دستگاه تلویزیون کوچکی که در جلوی پزشک قرار دارد به نمایش در خواهد آمد.

### آندوسکوپی چیست؟

یک روش تشخیصی درمانی است که به پزشک کمک می کند تا قسمت فوقانی دستگاه گوارش یعنی مری ، معده و ابتدای روده کوچک ببیند و بتواند مشکل کودک را تشخیص دهد. پزشک ممکن است حین انجام آندوسکوپی نمونه ای از بافت دستگاه گوارش زا نی بردارد و برای آزمایشات به آزمایشگاه بفرستد و آندوسکوپی حدوداً بین ۱۵ - ۲۰ دقیقه طول می کشد.




بیمارستان حضرت فاطمه (س) میاندوآب

### آندوسکوپی

دکتر نازنین امین فرزانه  
 فوق تخصص گوارش کودکان  
 منبع: پرستاری گودگان و نق

### قبل از انجام آندوسکوپی چه باید کرد؟

- ✓ بسته به سن کودکتان پرستار به شما خواهد گفت از چه ساعتی قبل از آندوسکوپی هیچ غذا یا مایعاتی به کودک ندهید.
- ✓ اگر کودکتان سابقه حساسیت به دارو، آرام بخش یا داروی بیهوشی دارد حتماً به پزشک و پرستارتان بگویید
- ✓ به تمام توصیه های گفته شده پزشک و پرستار حتماً عمل کنید
- ✓ اگر کودکتان مشکل قلبی و یا سایر بیماری مزمن را دارد به پزشک و پرستار بگویید



\*\*توجه : مادر گرامی کودکان به علت سن پایین در معرض سقوط از تخت می باشند که عوارض جبران ناپذیر دارد. خواهشمند است مراقب سقوط کودک از تخت باشید.

## توجه کنید در صورت مشاهده هر یک از این علایم، پرستار خود را مطلع سازید:

- سرفه همراه با خون زیاد بلافضله پس از آندوسکوپی
- احساس سوزش گلو ادامه پیدا کند
- درد قفسه سینه یا شکم درد ادامه پیدا کند
- تب بالا

## چگونه به کودکتان کمک کنید تا برای انجام آندوسکوپی آماده شود؟

- به وی توضیح دهید که پزشک می خواهد معده و روده وی را بررسی کند و از جملات ساده و مختصر برای توضیح آزمایش به کودک استفاده کنید.
- اگر کودکتان کوچک است در شب قبل از انجام آزمایش برایش مختصراً توضیح دهید، اگر بزرگتر است به توضیحات بیشتری برای درک آزمایش نیاز دارد.
- تا آنجا می توانید برای وی توضیح دهید که هنگام آزمایش چه احساسی خواهد داشت.
- به وی بگویید که یک آنژیوکت داخل رگ او قرار می دهدند تا بتوانند داروهارا به او تزریق کنند. هنگام وارد کردن آنژیوکت مختصراً درد خواهد داشت (که البته در کودکتان بستره در بخش این آنژیوکت از قبل تعییه شده است) و زمانی که دروها تزریق شوند کودک دیگر چیزی را احساس نخواهد کرد.
- هنگام توضیح دان آزمایش از بازی استفاده کنید مثلاً آزمایشرا از زبان عروکش بگویید.

## بعد از انجام آندوسکوپی چه میشود؟

- معمولاً یک الی دو ساعت طول می کشد تا داروی خواب آور اثرشان را از دست بدهنند و کودکتان هوشیار شود. تا زمان هوشیاری از گذاشتن بالش زیر سر بیمار خوداری کنید.
- معمولاً دارو های بیهوشی امکان استفراغ وجود دارد. جهت جلوگیری از آسپراسیون (برگشت مواد به ریه) سر بیمار را یک طرفه نگه دارید.
- تا زمان هوشیاری کامل به کودک مواد غذایی ندهید. معمولاً پس از بیدار شدن کامل کودک می تواند رژیم غذایی طبیعی داشته باشد، مگر اینکه پزشک و پرستار محدودیت غذایی را به شما توصیه کنند.
- ممکن است پزشک بلافضله پس از آندوسکوپی توضیح مختصراً در مورد نتیجه انجام صورت گرفته به شما بدهد ولی جواب کامل آن هر وقت آماده شد به شما داده خواهد شد.